

Folano **Ca**29

Il calcio per l'orticoltura, la frutticoltura, la viticoltura.

Concime fogliare per prevenire i sintomi di carenza di calcio, favorire la consistenza dei frutti e contrastare le malattie fisiologiche da conservazione.

- microgranuli privi di polvere
- polvere altamente solubile in acqua e miscelabile
- elevata tollerabilità delle piante
- Nessuna formazione di grasso o residui sulla buccia della frutta
- dosaggio di calcio molto elevato con 1450 g/ha a 5 kg/ha
- facile smaltimento dell'imballaggio



Principio attivo	Formiato di calcio
Contenuto di calcio	Ca 29 % (40,6 % CaO)
Stato fisico	Polvere
Colore	bianco/leggermente giallastro
Odore	Leggermente acidulo
pH	5-6
Confezione	Cartone da 15 kg (3 sacchetti da 5 kg, plastica rivestita di alluminio)



Ticchiolatura

Folano Ca29 viene utilizzato in modo mirato contro diversi danni fisiologici quali la ticchiolatura, l'imbrunimento della buccia e della polpa. Favorisce la consistenza della buccia, dell'esocarpo degli acini, dei frutti e delle foglie e contribuisce a ridurre lo spaccamento delle ciliegie e le microfessurazioni delle prugne. Inoltre, nella coltivazione degli ortaggi, aiuta a ridurre o prevenire il marciume apicale, il marciume interno e la necrosi del margine fogliare, a seconda della sensibilità della varietà. Folano Ca29 migliora in modo significativo la qualità e la durata dei frutti nella frutticoltura, aumentando il loro contenuto di calcio e ottimizzando le proprietà di conservazione. Stabilizza il frutto e la buccia e garantisce un rapporto equilibrato tra potassio e calcio.

Folano Ca29 favorisce inoltre la vitalità e la struttura delle foglie.

Folano Ca29 è un fertilizzante fogliare a base di calcio versatile, privo di azoto e sali, che può essere utilizzato tutto l'anno e mostra la massima efficacia soprattutto durante la fase di sviluppo dei frutti. Folano Ca29 garantisce un eccellente apporto di calcio durante la divisione cellulare dei frutti, può essere miscelato senza problemi con prodotti fitosanitari e non richiede l'aggiunta di agenti umettanti. Inoltre, Folano Ca29 rappresenta una valida alternativa al cloruro di calcio in condizioni climatiche calde e secche, nonché ad altri fertilizzanti a base di calcio come il nitrato di calcio e il solfato di calcio.

Consigli per l'uso

Orticoltura



Peperone e Pomodoro **BBCH 51 > BBCH 89**

Dalla prima infiorescenza visibile, applicare continuamente ogni 7-10 giorni 5 kg/ha fino al cambiamento di colore dei frutti. È possibile combinare il trattamento con fungicidi o insetticidi.



Cavolo, verdura a foglie e insalata **BBCH 13 > BBCH 49**

A partire dal trapianto, trattare ad ogni trattamento fitosanitario o ogni 7 giorni, inizialmente con 2,5 kg/ha, aumentando poi a 5 kg/ha prima del raccolto.

Frutticoltura



Mirtillo **BBCH 69 > BBCH 89**

Dopo la fioritura con quattro trattamenti con una quantità di applicazione di 5 kg/ha fino a poco prima del raccolto. È possibile una combinazione con trattamenti fungicidi o insetticidi.



Fragola/Lampone/Mora **BBCH 56 > BBCH 85**

A partire dalla caduta dei fiori con almeno quattro trattamenti e una dose iniziale di 5 kg/ha e 2,5 kg/ha poco prima del raccolto. È possibile una combinazione con trattamenti fungicidi o insetticidi. Nelle fragole rifiorenti, al più tardi a partire dalla terza fioritura, dalla caduta dei fiori fino al cambiamento di colore, 5 kg/ha a intervalli di 7 giorni.



Mela/Pera **BBCH 69 > BBCH 75** **BBCH 81 > BBCH 89**

Dopo la fioritura, con intervalli di irrorazione brevi fino a 5 giorni: 1,75 kg/ha, 5-10 giorni 2,5 kg/ha e con intervalli più lunghi superiori a 14 giorni 5,0 kg/ha. Applicare almeno 20 kg/ha entro la fine della fase di divisione cellulare. L'applicazione può essere combinata con fungicidi o insetticidi. Prima del raccolto irrorare almeno due volte con 5 kg/ha, idealmente in combinazione con irrorazioni di stoccaggio e il più vicino possibile al momento del raccolto.



Ciliegia **BBCH 69 > BBCH 85**

Dopo la fioritura, effettuare almeno tre trattamenti con una dose di 5 kg/ha fino al cambiamento di colore. È possibile combinare il trattamento con fungicidi o insetticidi.



Prugna **BBCH 69 > BBCH 85**

Dopo la fioritura, a intervalli di 10 giorni con una dose di 5 kg/ha fino al cambiamento di colore. È possibile combinare il trattamento con fungicidi o insetticidi.

Viticoltura



Vite **BBCH 71 > BBCH 81**

Da 3 a 8 trattamenti da quando i giovani frutti iniziano ad ingrossarsi con una dose base di 2,5 kg/ha o da 2,5 kg/ha a 6,0 kg/ha in aumento, da uno a due trattamenti quando i frutti sono completamente sviluppati, dalla chiusura dei grappoli fino all'inizio della colorazione. È possibile una combinazione con trattamenti fungicidi o insetticidi.

Distribuito da:



Via Copernico 11 - 39100 Bolzano (BZ)

Info@agrochimica.it

Tel. +39 0471 563700